

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**Aknefug® Oxid Mild 10%**

13,33 g wasserhaltiges Benzoylperoxid (entspr. 10 g Benzoylperoxid) pro 100 g Gel

Liebe Patientin, lieber Patient, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aknefug Oxid Mild 10% jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Aknefug Oxid Mild 10% und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% beachten?
3. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Aknefug Oxid Mild 10% und wofür wird es angewendet?

Aknefug Oxid Mild 10% ist ein schälendes und antibakterielles Gel zur Anwendung auf der Haut.

Aknefug Oxid Mild 10% wird angewendet bei allen Formen der endogen (d. h. durch die hormonelle Umstellung in der Pubertät) bedingten Akne, besonders an Brust und Rücken sowie bei Patienten, die auf Arzneimittel mit 5% Benzoylperoxid nicht ausreichend ansprechen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% beachten?**Aknefug Oxid Mild 10% darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Benzoylperoxid, Stearylalkohol oder einen der sonstigen Bestandteile von Aknefug Oxid Mild 10% sind (siehe Abschnitt 6 „Weitere Informationen“).
- auf Schleimhäuten, im Auge, im Mund-, Augen- und Nasenwinkel-Bereich sowie auf abgeschürfter Haut. Aknefug Oxid

Mild 10% ist nur für die äußerliche Anwendung bestimmt.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% ist erforderlich

- bei trockener und sebostatischer Haut (Haut mit verminderter Talgproduktion) des Atopikers. Hier sollte immer zunächst ein Arzt befragt werden.
- da eine Verstärkung von UV-Licht-Reaktionen möglich ist, was z. B. zu einer erhöhten Sonnenbrandneigung führen kann. Während der Behandlung mit Aknefug Oxid Mild 10% sollte daher eine intensive Sonnen- oder Solariumbestrahlung (UV-Bestrahlung) auf den behandelten Körperpartien unterbleiben.
- damit Aknefug Oxid Mild 10% nicht in die Haare bzw. über die Hände oder die behandelte Haut auf farbige Textilien (z. B. Bettwäsche, Kleidung, Handtücher, Waschlappen) gelangt, da es sonst zu einer Bleichung (Entfärbung) kommen kann.
- damit Aknefug Oxid Mild 10% nicht versehentlich ins Auge gelangt, denn dies führt zu Rötung und Brennen. Spülen Sie dann das Auge ca. 15 Minuten reichlich mit fließendem Wasser aus.
- denn wenn Sie oder jemand anders versehentlich etwas Aknefug Oxid Mild 10% verschlucken oder einnehmen, kann der Wirkstoff Benzoylperoxid Beschwerden im Bereich der Speiseröhre und des Magens hervorrufen. Suchen Sie deshalb einen Arzt auf.

Bei Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% mit anderen Arzneimitteln

Vom zusätzlichen Gebrauch hautreizender Mittel und einer intensiven UV-Bestrahlung wird abgeraten.

Aknefug Oxid Mild 10% ist aufgrund des Wirkstoffs Benzoylperoxid inkompatibel mit reduzierenden Substanzen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aknefug Oxid Mild 10% sollte in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Beratung mit dem Arzt angewendet werden.

Im letzten Monat der Schwangerschaft sollte das Präparat nicht angewendet werden. Erkenntnisse über den Übergang in die Muttermilch nach äußerlicher Behandlung in der Stillzeit liegen nicht vor.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Aknefug Oxid Mild 10%

Stearylalkohol kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% anzuwenden?

Wenden Sie Aknefug Oxid Mild 10% immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Aknefug Oxid Mild 10% ist ein Gel zur Anwendung auf der Haut.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Aknefug Oxid Mild 10% 1- bis 2-mal täglich dünn auf die erkrankte Haut aufgetragen. Bei sehr empfindlicher Haut ist es vorteilhaft, mit einer einmaligen Anwendung jeweils abends zu beginnen bzw. zunächst ein schwächer dosiertes Arzneimittel mit 5% Benzoylperoxid zu verwenden.

Die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% sollte bis zum Abklingen der entzündlichen Hauterscheinungen, im Durchschnitt etwa 4 Wochen, erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge Aknefug Oxid Mild 10% angewendet haben als Sie sollten

Die Anwendung zu großer Mengen Aknefug Oxid Mild 10% kann übermäßiges Austrocknen und verstärktes Schälen der Haut zur Folge haben. Setzen Sie in diesen Fällen die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% aus und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% vergessen haben

Setzen Sie die Behandlung entsprechend der angegebenen Dosierungsanleitung fort.

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% abbrechen

In diesem Fall sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Aknefug Oxid Mild 10% Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Aknefug Oxid Mild 10% nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Selten (1 bis 10 Behandelte von 10 000) können Benzoylperoxid oder die sonstigen

Bestandteile von Aknefug Oxid Mild 10% zu einer Überempfindlichkeitsreaktion (kontaktallergische Sensibilisierung) führen.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Gelegentlich (1 bis 10 Behandelte von 1 000) können zu Beginn der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% leichte Hautreizungen wie Rötung, Juckreiz, Brennen und Spannen auftreten. Dies sind Zeichen der erwarteten Wirkung und sie klingen in der Regel nach einigen Tagen ab. Ein Austrocknen und mäßiges Schälen der Haut sind therapeutisch erwünscht. Sollten diese Anzeichen nach 4–6 Tagen noch bestehen oder sich verstärken, ist Aknefug Oxid Mild 10% abzusetzen oder die Dosierung zu reduzieren.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% aufzubewahren?

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Im Kühlschrank lagern (2°C–8°C).

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate

6. Weitere Informationen:

Was Aknefug Oxid Mild 10% enthält:

Der Wirkstoff ist Benzoylperoxid.

100 g Gel enthalten 13,33 g wasserhaltiges Benzoylperoxid (entspr. 10 g Benzoylperoxid).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Carmellose-Natrium (E 466), mikrokristalline Cellulose (E 460a), Chlorwasserstoffsäure (E 507), Ethanol 96%, Macrogol 400, Macrogollaurylether (4) (Ph. Eur.), Macrogolstearylether (7) (Ph. Eur.), Stearylalkohol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser.

Wie Aknefug Oxid Mild 10% aussieht und Inhalt der Packung:

Aknefug Oxid Mild 10% ist ein gleichmäßig weißes, dünnflüssiges Gel in Kunststofftuben. Die Packungen enthalten 40 g und 50 g Gel zur Anwendung auf der Haut.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld
Telefon: (0521) 8808-05
Fax: (0521) 8808-334
E-Mail: info@wolff-arzneimittel.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2009.

DR·WOLFF